

## Quarentena, porquê?

A quarentena é o período pela qual um pássaro novo no plantel ou que foi para fora da criação e voltou deve passar.

Este período deve ser de pelo menos 21 dias, isolado do restante plantel em gaiola destinada ao efeito e de fácil limpeza, tipo (gaiola de exposição) ou outra de acordo com as características da ave.

Este pássaro deve ser acompanhado diariamente para observarmos seus sintomas clínicos, parasitários (piolhos) e mudanças de comportamento.

Quando possível deve-se fazer exames parasitários de fezes e cultura microbiológica das mesmas.

Muitas vezes poderemos fazer medicações anti-stress com soro e vitaminas na chegada.

Banhos contra piolhos, vermifunção após exames de fezes; antibióticos; coccidiostáticos; vacinas; e remédios homeopáticos, tudo na dependência do diagnóstico verificado.

Este é um período fundamental e estratégico em defesas de seu plantel.

### \* PERÍODO DE INCUBAÇÃO DAS DOENÇAS DOS PÁSSAROS

No tempo de demora de manifestação dos primeiros sintomas, a doença pode estar sendo transmitida.

Patologia Pássaros Acometidos Período de Incubação

Psitacose papagaios e calopsitas 48 dias a 1,5 anos

Newcastle psitacídeos canoros 4 a 7 dias

Bouba canários, galinhas, pombas 7 a 15 dias

Salmonellose todas as aves (canários) 3 a 5 dias

Colibacilose todas as aves (canários) 1 a 2 dias

Candidiase (sapinho) aves jovens debilitados variados

Aspergilose todas as aves (canários) variados

Coccidiose todas as aves (canários) 3 a 5 dias

Mycoplasmosse todas as aves (canários) longos períodos

Ácaros e piolhos todas as aves (canários) variados

Ácaros de traqueia canários variado